

新冠疫苗接種說明書 (用於追加劑(第三劑)接種)

關於接種新冠疫苗

本疫苗已被列入中央及地方政府針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的疫苗接種計畫，其接種由公費負擔，有接種意願者可以免費接種，此外，追加劑(第三劑)接種本疫苗的群體年齡在12歲(含)以上。

疫苗效果及接種方法

本疫苗由輝瑞公司生產，可預防感染新冠病毒發病。

有報告顯示，從追加接種本疫苗起1個月後的中和抗體效價比接種第二劑1個月後的中和抗體效價還要高出數倍。

產品名稱	復必泰 (Comirnaty) 肌肉注射
保護效果	預防由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的感染性疾病
接種劑次及間隔	1次(接種第二劑後間隔一段時間) *肌肉注射
接種對象	12歲(含)以上
接種劑量	1次0.3mL，共1劑

- 根據預防接種法，追加接種的間隔因接種對象而不同(現在是6~8個月)。請確認您所在的當地政府所寄發的通知。
- 無論第一劑和第二劑接種的疫苗廠牌，均可接種本疫苗。
- 並非追加接種本疫苗就能完全預防感染。另外，無論您是否接種本疫苗，都需要持續採取適當的防疫措施。

接種禁忌

下列對象不宜接種本疫苗。如果符合以下任一情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 明顯發燒症狀(*1)
- 患有嚴重急性病
- 對本疫苗的任一成分出現過嚴重過敏症狀(*2)
- 除上述明顯情形外其他不直接種者

(*1) 明顯發燒症狀通常指體溫超過37.5°C。但是即使體溫低於37.5°C，與平常體溫相比被診斷為發燒者不在此限。

(*2) 過敏反應或疑似過敏反應的多種症狀，包括全身性皮膚和黏膜症狀、出現喘氣、呼吸困難、心跳過快或血壓過低。若第一劑或第二劑接種時出現這些症狀者，不可追加接種同款疫苗。

接種注意事項

符合下列任一情形者，須對接種疫苗持謹慎態度。如果遇到下列情形，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

- 正在進行抗凝血治療、患血小板減少症或凝血功能障礙症
- 曾被診斷為免疫缺陷、或近親患有先天性免疫缺陷
- 患有心臟、腎臟、肝臟、血液疾病或發育障礙等基礎疾病
- 曾接種過疫苗並在接種兩天內出現發燒、全身紅疹等過敏症狀
- 曾出現痙攣症狀
- 可能對疫苗成分過敏

已懷孕或可能懷孕、或處於哺乳期，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。然而，即便未向常就診的婦產科醫師確認，若在接種前的問診時醫師判斷可以接種疫苗，則可以接種。

本疫苗產品含有未在其它疫苗中使用過的添加成分。如果曾對藥物有過敏症狀或過敏，請務必在接種前的問診中明確告知醫師。

(續背面)

接種後注意事項

- 接種疫苗後請在接種地點至少停留 15 分鐘(如果曾出現過包括過敏休克在內的嚴重過敏反應，或出現噁心、昏迷等症狀，請至少停留 30 分鐘)。如果接種疫苗後感到不適，請立即聯繫醫師。(可處理突發性不良反應。)
- 接種部位需保持乾淨。接種疫苗當天可以沐浴，但請勿揉擦接種部位。
- 日常生活並無影響，但接種疫苗當天應避免劇烈運動或過度飲酒。

不良反應

- 主要的不良反應為接種部位疼痛、頭痛、關節及肌肉疼痛、疲勞感、畏寒以及發燒等。罕見的嚴重不良反應包括休克及過敏症。由於本疫苗屬於新型疫苗，有可能引起一些目前尚未發現的症狀。如果疫苗接種後察覺到任何相關症狀，請聯繫接種醫師或經常就診的醫師。
- 有報告顯示，極少數人在首次(第一劑、第二劑)接種疫苗後出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀(*)。如果接種疫苗後幾天內出現胸痛、心悸、氣喘、浮腫等症狀，請您儘快就醫。
(*) 與第一劑相比，這種症狀多出現於接種第二劑疫苗後，年輕人、尤其是男性更多見。
- 有報告顯示，與接種第一劑和第二劑相比，較多人在追加接種疫苗後出現以腋下淋巴結腫脹為主的症狀(5%左右)。症狀較輕，大多會在數日內恢復，但若腫脹嚴重或持續時間較長，請至醫療機構就診。

關於接種疫苗引起的健康損害保障機制

接種疫苗可能會引起一些健康損害(例如疾病或身體障礙)。儘管屬於罕見個案，但由於無法完全避免，所以已設有保障機制。

如果因接種新冠疫苗而引起健康損害，根據「預防接種法」的規定獲得保障(領取醫療費、傷殘年金等)。關於必要的申請程序等，請洽詢住民票所在地的地方政府。

關於新冠病毒的感染症狀

感染新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)後，患者會出現發燒、咳嗽等類似普通感冒的症狀。儘管多數輕症患者能治癒，但仍有重症感染者會患有呼吸困難及嚴重肺炎症狀，嚴重者可能會致死。

此次接種的新冠疫苗(輝瑞公司生產)的特點

本疫苗屬於 mRNA 疫苗。配方中的 mRNA 會嵌入脂膜，它是新冠病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(病毒入侵人體細胞時所需的蛋白)的“藍圖”。當 mRNA 透過疫苗接種進入人體後，病毒性刺突蛋白會按照 mRNA 在人體細胞內生成，由此誘發對抗刺突蛋白的中和抗體和細胞免疫反應，後者能預防感染新冠病毒。

本疫苗包含以下成分:

有效成分	◇ Tozinameran (mRNA，編碼附著在人體細胞膜的全長刺突蛋白)
添加成分	◇ ALC-0315: [(4-羥丁基)氮雜二基(己烷-6,1-二基)雙(2-己基癸酸酯)] ◇ ALC-0159: 2-[(聚乙二醇)-2000]-N,N-二十四烷基乙酰胺 ◇ DSPC: 1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 ◇ 膽固醇 ◇ 氯化鉀 ◇ 磷酸二氫鉀 ◇ 氯化鈉 ◇ 磷酸氫二鈉二水合物 ◇ 蔗糖

更多關於新冠疫苗的資訊，請上“厚生勞動省”網站。

厚生勞動省

新型冠狀病毒疫

檢 索

如果無法瀏覽該網站，請洽詢所在地的地方政府。

